

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 161
du 11 Janvier 1990

<< PACE E SALUTE A TUTTI >>

VIGNE

Au moment de la taille, repérez les parcelles atteintes d'esca, d'excoriose ou d'eutypiose. Préparez les traitements et n'oubliez pas les mesures prophylactiques!

**** Eutypiose**

Les cas de vignes touchées restent assez rares. L'eutypiose se traduit par un rabougrissement des souches. La coupe transversale d'un bras laisse apparaître une nécrose brune sectorielle. Dans l'état actuel des connaissances, aucune matière active n'est jugée efficace. Seules les mesures prophylactiques s'imposent:

- Supprimez les ceps morts. Coupez les bras morts et brûlez le tout rapidement.
- Enduisez de mastic les grosses plaies immédiatement après la taille.
- Taillez par temps sec et sans vent.

**** Esca**

C'est au contraire la maladie du bois la plus grave dans notre région. Il arrive que esca et eutypiose cohabitent et que leurs symptômes soient associés sur une même souche.

Rappelez vous que les pieds atteints d'esca flétrissent en été brusquement. Une coupe transversale du tronc met en évidence une zone centrale jaune et molle, souvent bordée d'un liseré marron.

405043422

P1

.../... 1990: n° 161 - 186 up 173, 177

- Les mesures prophylactiques sont nécessaires brûlez tous les déchets de taille.

- L'arsenite de soude à 1250 g/hl reste un produit de traitement efficace.

: Les spécialités commerciales :
: contiennent un répulsif pour :
: le gibier. :

: Attention : le produit est toxique :
: pour l'homme. :

: A appliquer 15 jours après la taille et :
: 3 semaines avant la date supposée de :
: debourrement. :

: Renouvelez le traitement deux à trois :
: années de suite :

**** Excoriose**

A cette époque, on peut observer les rameaux atteints ; de couleur blanchâtre, parsemés de pycnides (points noirs), ils présentent souvent à leur base des éclatements de l'écorce et des taches marrons. Cette maladie du bois évolue peu dans notre région . L'arsenite de soude est efficace à la dose de 625 g/hl.

Pensez aux panneaux récupérateurs de bouillie. Ils ont plusieurs intérêts :

- économique = on récupère 2/3 de bouille (on fait 3 ha au lieu d'1 sans les panneaux).
- technique = le mouillage est très bon
- toxicologique = l'applicateur reçoit moins d'embruns.

PINS

On observe les toutes premières descentes de chenilles processionnaires du pin. Actuellement n'utilisez pas de produit .Entourez plutôt le bas du tronc d'un anneau de glu sur 30 à 40 cm . Les chenilles viendront s'y agglutiner et mourir.

(C) SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1990 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.